

DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Dec [1]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						6
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
6-Oct	8 weke voor paring	1 Laat toets ramme 2 Skeer ramme 3 Begin ramme fiks kry Sorg vir genoeg ramme [2] 4		1 Ramme - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ramme - Neuswurm (inspuitbaar) [3]	1 Ramme - Vit A 2 Ramme - Minerale [4]	1 Begin om ramme ekstra voeding te gee (indien nodig) [5]
20-Oct	6 weke voor paring	1 Mikskeer ooie [6]	1 Ooie - Ensootiese aborsie [7]	1 Ooie - Interne parasiete (oraal)	1 Ooie - Vit A & E 2 Ooie - Minerale [8]	
10-Nov	3 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [9]		
17-Nov	2 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [10]		
22-Nov	9 dae voor paring	1 Sit koggelramme by ooie 2 Ondersoek die ramme vir dekgereedheid [11]				1 Skuif ooie na nuwe kampe om hulle op 'n natuurlike wyse te prikkel 2 Gee ooie prikkelvoeding as die veld baie droog is [12]
24-Nov	1 week voor paring			1 Ramme - Koringkiem [13]		
		1 Haal koggelramme uit Sit ramme in 2 3				

DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Dec [1]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						6
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
1-Dec		Moenie ooie tydens hierdie periode hanteer nie [14]				
12-Jan		1 Haal ramme uit 2 Probeer om nie die ooie in volgende 6 weke te hanteer nie [15]	1 Ent ramme Bloutong A, Bloednier en Pasteurella (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie) [16]			
9-Feb			1 Ent ramme Bloutong B (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie)			
23-Feb	6 weke na ramme uitgehaal is	1 Skandeer ooie [17]				
9-Mar			1 Ent ramme Bloutong C (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie)			
16-Mar	6 weke voor ooie lam	1 Skeer of mikskeer die ooie [18]	1 Ooie - Pasteurella 2 Ooie - Bloednier 3 Ooie - Blou-uier 4 Ooie - Rooi/Bloedderm (indien probleem) [19]	2 Ooie - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ooie - Neuswurm (inspuitbaar) [20]	1 Ooie - Minerale	1 Kondisie-punt ooie - tree op as kondisie swak is 2 Ooie - begin met lek-aanvulling vir dragtige ooie (opsioneel) [21]
13-Apr						1 Skuif ooie na lam kampe [22]

DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Dec [1]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						6
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
27-Apr	Ooie begin lam	1 Ooie begin lam				1 Ooie - pas lek-aanvulling aan vir lakterende ooie (opsioneel)
11-May	2 weke nadat ooie begin lam het					1 Lammers - begin met kruip-voeding (opsioneel) [23]
11-Jun		1 Ooie klaar gelam				
8-Jun	6 weke nadat ooie begin lam het	1 Soog & Droog Ooie [24]				1 Skuif na nuwe kampe [25]
10-Aug	2 maande nadat ooie klaar gelam het			1 Lammers - Melklintwurm [26]	1 Lammers - Vit A 2 Lammers - Minerale	
9-Sep	3 maande nadat ooie klaar gelam het		1 Lammers - Bloednier 2 Lammers - Pasteurella [27]	1 Lammers - Lintwurm Lammers - Interne parasiete [28]		
		1 Speen lammers	2	1 Vervangings ooilammers -		

DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Dec [1]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						6
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
16-Oct	Op speendag	Selekteer vervangings-ooie 3 Soog & Droog 4 Skot ou ooie uit [29]	Bloutong A [30]			
30-Oct	2 weke na speendag	1 Soog & Droog Ooie [31]				
13-Nov			1 Vervangings oilammers - Bloednier opvolg 2 Vervangings oilammers - Bloutong B [32]			
11-Dec			1 Vervangings oilammers - Bloutong C [33]			



DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Mar [34]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						5
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
4-Jan	8 weke voor paring	1 Laat toets ramme 2 Skeer ramme 3 Begin ramme fiks kry Sorg vir genoeg ramme [35]	4	1 Ramme - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ramme - Neuswurm (inspuitbaar) [36]	1 Ramme - Minerale [37]	1 Begin om ramme ekstra voeding te gee (indien nodig) [38]
18-Jan	6 weke voor paring	1 Mikskeer ooie [39]	1 Ooie - Ensootiese aborsie [40]	1 Ooie - Interne parasiete (oraal) 2 Ooie - Neuswurm (oraal)	1 Ooie - Minerale [41]	
8-Feb	3 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [42]		
15-Feb	2 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [43]		
20-Feb	9 dae voor paring	1 Sit koggelramme by ooie (opsioneel) Ondersoek die ramme vir dekgereedheid [44]	2			1 Skuif ooie na nuwe kampe om hulle op 'n natuurlike wyse te prikkel [45]
22-Feb	1 week voor paring			1 Ramme - Koringkiem [46]		
		1 Haal koggelramme uit Sit ramme in	2 3			

DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Mar [34]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						5
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
1-Mar		Moenie ooie tydens hierdie periode hanteer nie [47]				
5-Apr		1 Haal ramme uit 2 Probeer om nie die ooie in volgende 6 weke te hanteer nie [48]	1 Ent ramme Bloutong A, Bloednier en Pasteurella (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie) [49]			
3-May			1 Ent ramme Bloutong B (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie)			
17-May	6 weke na ramme uitgehaal is	1 Skandeer ooie [50]				
31-May			1 Ent ramme Bloutong C (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie)			
14-Jun	6 weke voor ooie lam	1 Skeer of mikskoor die ooie [51]	1 Ooie - Pasteurella 2 Ooie - Bloednier 3 Ooie - Blou-uier 4 Ooie - Rooi/Bloedderm (indien probleem) [52]	1 Ooie - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ooie - Neuswurm (inspuitbaar) [53]	1 Ooie - Vit A & A 2 Ooie - Minerale [54]	1 Kondisie-punt ooie - tree op as kondisie swak is 2 Ooie - begin met lek-aanvulling vir dragtige ooie [55]
12-Jul						1 Skuif ooie na lam kampe [56]

DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Mar [34]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						5
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
26-Jul	Ooie begin lam	1 Ooie begin lam				1 Ooie - pas lek-aanvulling aan vir lakterende ooie
9-Aug	2 weke nadat ooie begin lam het					1 Lammers - begin met kruip-voeding [57]
2-Sep		1 Ooie klaar gelam				
6-Sep	6 weke nadat ooie begin lam het	1 Soog & Droog Ooie [58]				1 Skuif na nuwe kampe [59]
1-Nov	2 maande nadat ooie klaar gelam het			1 Lammers - Melklintwurm [60]	1 Lammers - Vit A 2 Lammers - Minerale	
1-Dec	3 maande nadat ooie klaar gelam het		1 Lammers - Bloednier 2 Lammers - Pasteurella [61]	1 Lammers - Lintwurm 2 Lammers - Interne parasiete [62]		



DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN = bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						1-Mar [34]
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) = bv. as dit 5 weke is, tik in 5						5
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) = bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						5
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding
11-Jan	Op speendag	1 Speen lammers Selekteer vervangings-ooie Soog & Droog Skot ou ooie uit [63]	2 3 4	1 Vervangings oilammers - Bloutong A [64]		
25-Jan	2 weke na speendag	1 Soog & Droog Ooie [65]				
8-Feb			1 Vervangings oilammers - Bloednier opvolg 2 Vervangings oilammers - Bloutong B [66]			
7-Mar			1 Vervangings oilammers - Bloutong C [67]			



<b>DATUM WANNEER DIE RAMME NA DIE OOIE GAAN =</b> bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar						<b>1-Mar [34]</b>
<b>LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =</b> bv. as dit 5 weke is, tik in 5						<b>5</b>
<b>GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =</b> bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4						<b>5</b>
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding

EERSTE PAARDATUM =					bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar		1-Jan [68]	1-Sep	2-May
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =									
bv. as dit 5 weke is, tik in 5							5		
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =									
bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4							4		
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding			
<b>EERSTE LAMSEISOEN</b>									
6-Nov	8 weke voor paring	1 Laat toets ramme 2 Skeer ramme 3 Begin ramme fiks kry Sorg vir genoeg ramme [69]	4	1 Ramme - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ramme - Neuswurm (inspuitbaar) [70]	1 Ramme - Minerale [71]	1 Begin om ramme ekstra voeding te gee (indien nodig) [72]			
20-Nov	6 weke voor paring	1 Mikskeer ooie [73]	1 Ooie - Ensootiese aborsie [74]	1 Ooie - Interne parasiete (oraal) 2 Ooie - Neuswurm (oraal)	1 Ooie - Minerale [75]				
11-Dec	3 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [76]					
18-Dec	2 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [77]					
23-Dec	9 dae voor paring	1 Onderzoek die ramme vir dekgereedheid [78]							
25-Dec	1 week voor paring			1 Ramme - Koringkiem [79]					
1-Jan		1 Sit ramme in Moenie ooie tydens hierdie periode hanteer nie [80]	2						
5-Feb		1 Haal ramme uit Probeer om nie die ooie in volgende 6 weke te hanteer nie [81]	2	1 Ent ramme Bloutong A, Bloednier en Pasteurella (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie) [82]					
5-Mar				1 Ent ramme Bloutong B (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie)					

EERSTE PAARDATUM =							bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar		
							1-Jan [68]	1-Sep	2-May
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =							5		
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =							4		
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding			
19-Mar	6 weke na ramme uitgehaal is	1 Skandeer ooie - ooi wat droog is skuif oor na trop wat eerste hierna gepaar gaan word [83]							
2-Apr			1 Ent ramme Bloutong C (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie)						
16-Apr	6 weke voor ooie lam	1 Skeer die ooie [84]	1 Ooie - Pasteurella Ooie - Bloednier Ooie - Blou-uier Ooie - Rooi/Bloedderm (indien probleem) [85]	2 3 4	1 Ooie - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ooie - Neuswurm (inspuitbaar) [86]	1 Ooie - Vit A & E 2 Ooie - Minerale [87]	1 Kondisie-punt ooie - tree op as kondisie swak is 2 Ooie - begin met lek-aanvulling vir dragtige ooie [88]		
16-May			1 Ooie Bloutong A						
6-Jun			1 Ooie Bloutong B						
28-May	Ooie begin lam	1 Ooie begin lam					1 Ooie - pas lek-aanvulling aan vir lakterende ooie		
11-Jun	2 weke nadat ooie begin lam het						1 Lammers - begin met kruip-voeding [89]		
27-Jun			1 Ooie Bloutong C						
5-Jul		1 Ooie klaar gelam							

EERSTE PAARDATUM =							bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar		
							1-Jan [68]	1-Sep	2-May
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =							bv. as dit 5 weke is, tik in 5		
							5		
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =							bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4		
							4		
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding			
9-Jul	6 weke nadat ooie begin lam het	1 Soog & Droog Ooie [90]							
27-Jul	2 maande nadat ooie begin lam het			1 Lammers - Melklintwurm [91]	1 Lammers - Vit A 2 Lammers - Minerale				
29-Aug	Op speendag	1 Speen lammers 2 Selekteer vervangings-ooie 3 Soog & Droog 4 Skot ou ooie uit [92]	1 Vervangings oilammers - 2 Bloutong A 3 Lammers - Bloednier 4 Lammers - Pasteurella [93]	1 Lammers - Lintwurm 2 Lammers - Interne parasiete [94]					
26-Sep			1 Vervangings oilammers - Bloednier opvolg 2 Vervangings oilammers - Bloutong B [95]						
24-Oct			1 Vervangings oilammers - Bloutong C [96]						
TWEDE LAMSEISOEN									
7-Jul	8 weke voor paring	1 Laat toets ramme 2 Skeer ramme 3 Begin ramme fiks kry 4 Sorg vir genoeg ramme [97]		1 Ramme - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ramme - Neuswurm (inspuitbaar) [98]	1 Ramme - Minerale [99]	1 Begin om ramme ekstra voeding te gee (indien nodig) [100]			
21-Jul	6 weke voor paring		1 Ooie - Ensootiese aborsie [101]	1 Ooie - Interne parasiete (oraal) 2 Ooie - Neuswurm (oraal)	1 Ooie - Minerale [102]				?
11-Aug	3 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [103]					

EERSTE PAARDATUM =					bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar		1-Jan [68]	1-Sep	2-May
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =							5		
bv. as dit 5 weke is, tik in 5									
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =							4		
bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4									
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding			
18-Aug	2 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [104]					
23-Aug	9 dae voor paring	1 Ondersoek die ramme vir dekgereedheid [105]							
25-Aug	1 week voor paring			1 Ramme - Koringkiem [106]					
1-Sep		1 Sit ramme in Moenie ooie tydens hierdie periode hanteer nie [107]	2						
6-Oct		1 Haal ramme uit Probeer om nie die ooie in volgende 6 weke te hanteer nie [108]	2						
17-Nov	6 weke na ramme uitgehaal is	1 Skandeer ooie - ooi wat droog is skuif oor na trop wat eerste hierna gepaar gaan word [109]							
15-Dec	6 weke voor ooie lam	1 Skeer die ooie [110]	1 Ooie - Pasteurella Ooie - Bloednier Ooie - Blou-uier Ooie - Rooi/Bloedderm (indien probleem) [111]	2 3 4	1 Ooie - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ooie - Neuswurm (inspuitbaar) [112]	1 Ooie - Vit A & E 2 Ooie - Minerale [113]	1 Kondisie-punt ooie - tree op as kondisie swak is 2 Ooie - begin met lek-aanvulling vir dragtige ooie [114]		
12-Jan									
26-Jan	Ooie begin lam	1 Ooie begin lam					1 Ooie - pas lek-aanvulling aan vir lakkerende ooie		

EERSTE PAARDATUM =					bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar		1-Jan [68]	1-Sep	2-May
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =							bv. as dit 5 weke is, tik in 5		
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =							bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4		
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding			
9-Feb	2 weke nadat ooie begin lam het					1 Lammers - begin met kruip-voeding [115]			
5-Mar		1 Ooie klaar gelam							
9-Mar	6 weke nadat ooie begin lam het	1 Soog & Droog Ooie [116]							
27-Mar	2 maande nadat ooie begin lam het			1 Lammers - Melkintwurm [117]	1 Lammers - Vit A 2 Lammers - Minerale				
29-Apr	Op speendag	1 Speen lammers 3 Selekteer vervangings-ooie 4 Soog & Droog Skot ou ooie uit [118]	2 1 Vervangings oilammers - Bloutong A 2 Lammers - Bloednier 3 Lammers - Pasteurella [119]	1 Lammers - Lintwurm 2 Lammers - Interne parasiete [120]					
27-May			1 Vervangings oilammers - Bloednier opvolg 2 Vervangings oilammers - Bloutong B [121]						
24-Jun			1 Vervangings oilammers - Bloutong C [122]						
DERDE LAMSEISOEN									
7-Mar	8 weke voor paring	1 Laat toets ramme 2 Skeer ramme 3 Begin ramme fiks kry 4 Sorg vir genoeg ramme [123]		1 Ramme - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ramme - Neuswurm (inspuitbaar) [124]	1 Ramme - Minerale [125]	1 Begin om ramme ekstra voeding te gee (indien nodig) [126]			
	6 weke voor	1 Mikskeer ooie [127]	1 Ooie - Ensootiese aborsie [128]	1 Ooie - Interne parasiete (oraal) 2 Ooie - Neuswurm (oraal)	1 Ooie - Minerale [129]				



EERSTE PAARDATUM =					bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar		1-Jan [68]	1-Sep	2-May
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =					bv. as dit 5 weke is, tik in 5		5		
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =					bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4		4		
Datum	Produksie Stadium o weke voor paring	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding			
21-Mar									
11-Apr	3 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [130]					
18-Apr	2 weke voor paring			1 Ramme - Koringkiem [131]					
23-Apr	9 dae voor paring	1 Onderzoek die ramme vir dekgereedheid [132]							
25-Apr	1 week voor paring			1 Ramme - Koringkiem [133]					
2-May		1 Sit ramme in Moenie ooie tydens hierdie periode hanteer nie [134]	2						
6-Jun		1 Haal ramme uit Probeer om nie die ooie in volgende 6 weke te hanteer nie [135]	2	1 Ent ramme Bloutong A, Bloednier en Pasteurella (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie) [136]					
4-Jul				1 Ent ramme Bloutong B (as hulle nie reeds na die vorige paring ge-ent is nie)					
18-Jul	6 weke na ramme uitgehaal is	1 Skandeer ooie - ooi wat droog is skuif oor na trop wat eerste hierna gepaar gaan word [137]							
				1 Ent ramme Bloutong C (as hulle nie reeds na die vorige					

EERSTE PAARDATUM =					bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar		1-Jan [68]	1-Sep	2-May
LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =							bv. as dit 5 weke is, tik in 5		
GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =							bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4		
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding			
1-Aug			paring ge-ent is nie)						
15-Aug	6 weke voor ooie lam	1 Skeer die ooie [138]	1 Ooie - Pasteurella 2 Ooie - Bloednier 3 Ooie - Blou-uier 4 Ooie - Rooi/Bloedderm (indien probleem) [139]	1 Ooie - Interne parasiete (inspuitbaar) 2 Ooie - Neuswurm (inspuitbaar) [140]	1 Ooie - Vit A & E 2 Ooie - Minerale [141]	1 Kondisie-punt ooie - tree op as kondisie swak is 2 Ooie - begin met lek-aanvulling vir dragtige ooie [142]			
14-Sep			1 Ooie Bloutong A						
5-Oct			1 Ooie Bloutong B						
26-Sep	Ooie begin lam	1 Ooie begin lam				1 Ooie - pas lek-aanvulling aan vir lakterende ooie			
10-Oct	2 weke nadat ooie begin lam het					1 Lammers - begin met kruip-voeding [143]			
26-Oct			1 Ooie Bloutong C						
3-Nov		1 Ooie klaar gelam							
7-Nov	6 weke nadat ooie begin lam het	1 Soog & Droog Ooie [144]							
	2 maande			1 Lammers - Melklintwurm [145]	1 Lammers - Vit A 2 Lammers - Minerale				

<b>EERSTE PAARDATUM =</b>					bv. as dit 1 Maart is, tik in 1-Mar	1-Jan [68]	1-Sep	2-May
					<b>LENGTE VAN PAARSEISOEN (WEKE) =</b> bv. as dit 5 weke is, tik in 5	5		
					<b>GEMIDDELDE OUDERDOM WAAROP LAMMERS GESPEEN WORD (MAANDE) =</b> bv. as hulle op 4 maande gespeen word, tik in 4	4		
Datum	Produksie Stadium	Kudde-Bestuur	Inentings	Doserings	Vitamiene en Spoor-elemente	Voeding		
25-Nov	nadat ooie begin lam het							
28-Dec	Op speendag	1 Speen lammers Selekteer vervangings-ooie Soog & Droog Skot ou ooie uit [146]	2 3 4	1 Vervangings ooilammers - Bloutong A Lammers - Bloednier Lammers - Pasteurella [147]	2 [148]	1 Lammers - Lintwurm Lammers - Interne parasiete		
25-Jan			1 Vervangings ooilammers - Bloednier opvolg 2 Vervangings ooilammers - Bloutong B [149]					
22-Feb			1 Vervangings ooilammers - Bloutong C [150]					



[1] Eduplan:

Januarie = JAN  
Februarie = FEB  
Maart = MAR  
April = APR  
Mei = MAY  
Junie = JUN  
Julie = JUL  
Augustus = AUG  
September = SEP  
Oktober = OCT  
November = NOV  
Desember = DEC

[2] Eduplan:

- 1 Ramme kan van die een dekseisoen na die ander onvrugbaar word. Toets die ramme elke keer voordat hulle na die ooie gaan vir vrugbaarheid en veneriese siektes. Nuwe ramme kan veneriese siektes inbring.
- 2 Ramme kan tydelik onvrugbaar word as hulle byvoorbeeld geskeer of vervoer word. Daarna neem dit minstens 8 weke om weer hul semen-volume aan te vul. Ramme moet dus klaar geskeer wees minstens 8 weke voor paartyd.
- 3 Koop nuwe ramme ook minstens 8 weke voor paartyd aan. Toets alle nuwe ramme vir veneriese siektes. Hou hulle apart van die ander ramme op die plaas totdat die toets-uitslae bekend is. Ramme kan mekaar aansteek.
- 4 Ons vergeet te maklik van die ramme op die plaas. Knap hul bestuur op.
- 5 Fikse ramme dek beter as oorvet, onfikse ramme. Stap rustig met die ramme vir 1 km per dag.
- 6 Ramme met 'n goeie libido en wat dekbehendig is gee aanleiding tot aansienlik meer lammers en oor 'n korter tydperk. 'n Projek in Noupoot het getoon dat dekbehendige ramme met 'n goeie libido tot soveel as 20% meer lammers gee as ramme wat lui is en nie goed kan dek nie. Probeer om 'n ram minstens een keer in sy leeftyd vir libido en dekbehendigheid te laat toets. Hoe jonget hoe beter. Moenie dink dat volwasse ramme beter doen as jong ramme nie. Daar is jong ramme wat nog nooit gedek het nie, wat baie dekbehendig is met 'n goeie libido. Netso, is daar volwasse ramme wat nie kan dek nie en glad nie in ooie belangstel nie.

[3] Eduplan:

- 1 Maak ramme vroegtydig skoon van interne parasiete, verkieslik met 'n breespektrum inspuibare middel, sodat hulle gesond en fiks is as hulle na die ooie gaan.
- 2 Die dosering wat toegedien word, moet ook neuswurm behandel. Ramme moet die ooie wat op hitte is goed kan ruik.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[4] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale, veral sink, speel 'n belangrike rol by seldeling, wat belangrik is vir goeie semenproduksie. Slegs nodig om in die winter en lente aan te vul.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[5] Eduplan:

Gebruiksramme is dikwels die mees vergete diere op 'n veeplaas.

Hulle moet fiks, gesond en in goeie kondisie wees as hulle by die ooie kom. Goeie ramme eet minder as hulle tussen die ooie is en verloor massa. Daarom moet hulle in goeie kondisie wees (nie oorvet nie) as hulle by die ooie kom.

'n Gesonde ram in goeie kondisie se semenproduksie sal ook bogemiddeld wees.

[6] Eduplan:

- 1 Mikskeer die ooie as hulle lang wol het. Dit vergemaklik die dek-proses

[7] Eduplan:

- 1 Ensootiese aborsie in 'n kudde kan tot groot verliese van fetusse lei. 'n Mens moet vermoed dat die ooie ensootiese aborsie het wanneer heelwat minder lamme gebore word as wat in die ooie gescan is.
- 2 Die entstof is duur en soms skaars. Probeer dus om slegs die vervangings-ooie jaarliks te ent met lewendige entstof. Dit sal lewenslange immuniteit gee.

[8] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale soos sink speel 'n belangrike rol by seldeling na bevrugting plaasgevind het. Dit is slegs nodig om Vit A in die winter en lente aan te vul.

[9] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[10] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[11] Eduplan:

In die verlede is koggelramme vir 14 dae by die ooie gelos. Nuwe navorsing het getoon dat dit beter is om vir 9 dae te koggel. Koggelramme veroorsaak dat die ooie binne 10 dae nadat die koggelramme bygesit is, begin ovuleer. Daarby, veroorsaak die koggelramme dat die ooie oor 'n korter periode ovuleer (dit is amper soos om die ooie se ovulasie te sinchroniseer). Hierdie ooie lam dan ook oor 'n korter periode. Dit help om die toesig oor die lamproses te konsentreer. Voorts is die ouderdomsverskil tussen die oudste en jongste lammers kleiner. Dit vergemaklik die seleksie van veral ooi- en ramlammers aansienlik.

- 1 Deur koggelramme by 'n herfsparing te gebruik sal nie noodwendig die besetting verbeter nie, maar wel die lamtyd verkort.
- 2 1% koggelramme behoort voldoende te wees.
- 3 Ronderib Afrikaners en Afrino's werk goed as koggelramme.
- 4 Laat maak koggelramme minstens 3 maande voor die dektyd. Die semen wat in koggelramme voorkom neem sowat 8 weke om uitgeput te raak. U wil nie u ooie van die koggelramme laat lam nie.
- 5 Ramme wat dekgered is se lieste is pers gekleur, die testikels is groot en het 'n ferm aanvoeling en die byballe is so groot soos okkerneute.

[12] Eduplan:

Ooie se toestand moet in 'n "groeifase" wees as die ramme bykom. Dit sal help dat hulle beter ovuleer (meer ovums oor 'n korter tydperk) om meer lammers oor 'n korter tydperk te gee. Dit sal die dektydperk verkort, asook die lamtydperk.

- 1 Daar is niks wat 'n ooie beter op hitte laat kom as goeie voeding nie. Vars veld werk soos 'n bom.
- 2 As dit droog is, sal vars veld alleen nie help nie. Gee die ooie 150g tot 200g sjokolade graan per ooi per dag vanaf 9 dae voor die ramme bygesit word tot 17 dae

nadat die ramme ingesit is.

[13] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[14] Eduplan:

- 1 Haal koggelramme teen laat-middag uit. Dan is dit koel en sal die ramme al die eerste nag baie goed werk.
- 2 Paar vervangings-ooie apart van die volwasse ooie. 'n Projek in Hanover het gewys dat jong ooie wat saam met volwasse ooie gepaar word, swak besetting het.
- 3 Gebruik minstens 5% ramme op die vervangings-ooie.
- 4 As daar in groot kampe of kampe met 'n bergagtige terrein gepaar word, moet u sorg dra dat die ooie en ramme wel bymekaar uitkom. Maak die vee elke 3 tot 4 dae bymekaar sodat hulle by mekaar uitkom.

DIE OOIE MOENIE TYDENS HIERDIE PERIODE HANTEER WORD NIE. DIT SAL DIE OVULASIE STOP.  
MOET VERAL NIE DIE OOIE SKEER NIE

[15] Eduplan:

Na bevrugting neem dit ongeveer 6 weke vir die fetus om aan die baarmoeder vas te heg. Hantering in hierdie periode kan veroorsaak dat die fetus nie vasheg nie.

[16] Eduplan:

- 1 Bloutong entstof veroorsaak dat diere wat geent word 'n koors ontwikkel. In die geval van ramme gee dit aanleiding tot tydelike onvrugbaarheid. As u met die bloutong inenting begin wanneer die ramme in die herfs by die ooie uitkom, word hierdie probleem opgelos.
- 2 Gebruik 'n kombiansie entstof vir bloednier en pastuerella, soos bv. Multivax P

[17] Eduplan:

- 1 Volwasse ooie: As 90% en meer van die ooie dragtig is, prul die wat droog is. Sommige boere paar hierdie ooie



met baster ramme. As hulle goed beset raak van die baster ramme, is daar fout met die ras-egte ramme.

- 2 Vervangings-ooie: As 70% en meer dragtig is, prul die wat droog is. Honderde projekte dwarsdeur die RSA het gewys dat vervangings-ooie wat met die eerste paring oorslaan, minstens 30% minder lammers produseer as die ootjies wat met die eerste paring dragtig raak. Hou eerder meer vervangings-ooie terug om hiervoor voorsiening te maak.

As minder as 70% dragtig is, is die fout by die "jockey". Gee die ooie dan weer 'n kans.

[18] Eduplan:

- 1 Dit is beter om ooie met kortwol te laat lam. Die redes hiervoor is as volg:
- a Lang wol word besoedel tydens die lamproses, deur grond en veral bloed en die vrugwater.
  - b Ooie met kortwol gaan soek skuiling in koue, nat weer, terwyl langwol ooie dit nie doen nie. Kortwol ooie se lammers oorleef sulke toestande beter.
  - c Kortwol ooie hanteer hittestres tydens die lamproses beter
- 2 Kort na geboorte het 'n lam 'n baie sterk drang om te suip (suig). Hy sal aan alle silindries voorwerpe in die omgewing van die ooie se uier suig. Hy sal veral aan stukke lox wat rondom die uier hang suig. Daarom is dit goed om alle wolklossies rondom die uier af te skeer sodat die lam dit nie met die spene verwar nie.

Ooie wat 'n moeilike geboorte gehad het, het dikwels 'n drup agter uit die vulva. As die ooi nie gemikskeer is nie, beland hierdie onsuiverhede rondom die uier, waar die lam dit inneem. Die gevolg is dat die lam infeksie opdoen en vrek.

[19] Eduplan:

Gebruik 'n kombinasie-entstof vir bloednier, pasteurella en blou-uier soos bv. Multivax P Plus of Ultra Choice 7.

Rooiderm is 'n siekte van beeste. Bloedderm kom by skape voor. Dit is presies dieselfde siekte, maar het twee verskillende name. By skape kom die siekte veral op sappige aangeplante weidings voor. Beide siektes word deur die A-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Coglavax is die aangewese entstof vir skape. As die ooie ge-ent is, kry die lammers immunititeit deur die bies van die ooie.

Rooiderm van skape word veroorsaak deur 'n verdraaiing van die derms.

Bloedpens is 'n siekte wat by skaaplammers jonger as 'n week voorkom. Dit word deur die B-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Die kombinasie-entstof wat bloednier, pasteurella en blou-uier doen, doen ook hierdie siekte.

[20] Eduplan:

- 1 Interne parasiete kan die hormonale verandering in 'n laat-dragtige ooi waarneem. Hulle reageer hierop deur meer eiers te begin afskei sodat die lam/mers wat gebore gaan word, met eiers besmet kan raak.
- 2 Ooie moet hulle lammers goed kan ruik. Daarom is dosering teen neuswurm belangrik.
- 3 Gebruik 'n inspuitbare, langwerkende middel, wat ook neuswurm en ekto-parasiete beheer.

[21] Eduplan:

- 1 Maer ooie (kondisie onder 3) se lammers is baie klein by geboorte (veral tweeling lammers). Hierdie klein lammers se oorlewing is baie laag. Hulle is te swak om te suip, het nie energie om agter die ooie aan te loop nie, en is so lig en swak dat selfs klein roofdiere soos witkwas- en grys-muishonde hulle kan vang. Verliese van hierdie swak lammers is geweldig hoog.

OOIE WAT MAER IS AS HULLE LAM  
SE HER-BESETTING% IS OOK LAAG

Oorvet ooie kan probleme met groot lammers en lammers wat vassit ondervind; veral jong en eenling ooie. Dra dus sorg om hierdie ooie nie te swaar te laat word oor die laaste 6 weke van dragtigheid nie. Tweeling ooie het nooit probleme hiermee nie.

- 2 Die fetusse begin nou baie groot raak en neem 'n groot deel van die ooie se buikspasie op. Dit beperk die ooi se spasie om voer in te neem. Sy moet dus nou goeie kos ontvang wat nie te veel

spasie in haar pens opneem nie. Proteien is veral belangrik.

- 3 Hierdie is die tyd wat die uier begin ontwikkel. Hoe beter dit nou ontwikkel, hoe meer bies en melk sal die ooi produseer.

[22] Eduplan:

- 1 Die fetusse begin nou baie groot raak en beperk diie ooi se spasie om voer in te neem. Sy moet dus nou goeie kos ontvang wat nie te veel spasie in haar pens opneem nie. Daarom, is dit goed om om haar nou na spaarveld of lande te skuif.
- 2 NB As u op lande lam, moenie die eenling ooie voor hulle lam na die lande skuif nie. Dit kan veroorsaak dat die fetusse te groot word, met gevolglike lamprobleme (veral by vervangings-ooie).

[23] Edulan:

Dit is goedkoper om eerder die lammers as die ooie kos te gee. Hulle begin reeds op twee weke ouderdom vreet. Sodra hulle die kruipvoeding goed vreet, kan die ooie se lek verminder word (of selfs gestop word).

Lammers wat kruipvoeding kry kan op 'n heelwat jonger ouderdom gespeen word (indien nodig - soos wanneer dit droog is).

Hoe swaarder die lammers by speen, hoe beter die naspeense groei.

[24] Eduplan:

SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers verloor.

Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.

[25] Louis:

Baie boere kry dat hul lammers goed groei tot hulle 2 maande oud is. Daarna gaan staan hul groei stil.

Ooie se melkproduksie neem 42 dae nadat sy gelam het vinnig af. Dan moet die lam goed vreet of sy groei gaan staan stil. Sy ma en die ander ooie is dan sy grootste kompetisie vir kos. Daarom is dit nodig om tydens hierdie periode na nuwe kampe te skuif.

[26] Eduplan:

- 1 Gewoonlik kry lammeers eerste melkintwurm. Hulle kry eers op sowat 3 maande ouderdom lintwurm.
- 2 Doseer lammers met 'n goedkoop orale middel vir melkintwurm

[27] Eduplan:

Gebruik 'n kombinasie-entsof soos bv. Multivax P Plus. Ent alle lammers, ook die wat binnekort verkoop gaan word. Die weerstand wat vanaf die ooie se bies ontvang is, is nou baie laag.

[28] Eduplan:

Gebruik 'n baie goeie, kombinasie orale dossermiddel soos bv. First Drench

[29] Eduplan:

- 1 SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers tussen merk en speen verloor. Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.
- 2 Moenie die boepens lammers speen nie. Los hulle by die ooie vir 'n verdere 14 dae sodat die ooie, wie se boepens lammers dit is, met SOOG & DROOG uitgeken kan word.
- 3 Seleksieplan vir die vervangings-ooie verskyn op die volgende bladsy (klik op SELEKSIEPLAN hieronder).
- 4 Ou ooie lam goed maar maak nie lammers groot nie. Bek al die ooie en gooi die uit wat sluit. As hulle nie geslag word nie, gee hulle dadelik weer ram en verkoop dragtig gesertifiseer.

[30] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

[31] Eduplan:

SOOG & DROOG die ooie om te bepaal watter ooie die moeders is van die boepens lammers. Hulle is swak moeders en moet geprul word. Merk hulle en verkoop hulle saam met hul lammers.

[32] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

[33] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word. Hierna word die vervangings-ooie saam met die teel-ooie ge-ent en gedoseer.

[34] Eduplan:

Januarie = JAN  
Februarie = FEB  
Maart = MAR  
April = APR  
Mei = MAY  
Junie = JUN  
Julie = JUL  
Augustus = AUG  
September = SEP  
Oktober = OCT  
November = NOV  
Desember = DEC

[35] Eduplan:

1 Ramme kan van die een dekseisoen na die ander onvrugbaar word. Toets die ramme elke keer voordat hulle na die ooie gaan vir vrugbaarheid en veneriese siektes. Nuwe ramme kan veneriese siektes inbring.

- 2 Ramme kan tydelik onvrugbaar word as hulle byvoorbeeld geskeer of vervoer word. Daarna neem dit minstens 8 weke om weer hul semen-volume aan te vul. Ramme moet dus klaar geskeer wees minstens 8 weke voor paartyd.
- 3 Koop nuwe ramme ook minstens 8 weke voor paartyd aan. Toets alle nuwe ramme vir veneriese siektes. Hou hulle apart van die ander ramme op die plaas totdat die toets-uitslae bekend is. Ramme kan mekaar aansteek.
- 4 Ons vergeet te maklik van die ramme op die plaas. Knap hul bestuur op.
- 5 Fikse ramme dek beter as oorvet, onfikse ramme. Stap rustig met die ramme vir 1 km per dag.
- 6 Ramme met 'n goeie libido en wat dekbeendig is gee aanleiding tot aansienlik meer lammers en oor 'n korter tydperk. 'n Projek in Noupoot het getoon dat dekbeendige ramme met 'n goeie libido tot soveel as 20% meer lammers gee as ramme wat lui is en nie goed kan dek nie. Probeer om 'n ram minstens een keer in sy leeftyd vir libido en dekbeendigheid te laat toets. Hoe jonget hoe beter. Moenie dink dat volwasse ramme beter doen as jong ramme nie. Daar is jong ramme wat nog nooit gedek het nie, wat baie dekbeendig is met 'n goeie libido. Netso, is daar volwasse ramme wat nie kan dek nie en glad nie in ooie belangstel nie.

[36] Eduplan:

- 1 Maak ramme vroegtydig skoon van interne parasiete, verkieslik met 'n breespektrum inspuibare middel, sodat hulle gesond en fiks is as hulle na die ooie gaan.
- 2 Die dosering wat toegedien word, moet ook neuswurm behandel. Ramme moet die ooie wat op hitte is goed kan ruik.

**VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK**

[37] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale, veral sink, speel 'n belangrike rol by seldeling, wat belangrik is vir goeie semenproduksie. Slegs nodig om in die winter en lente aan te vul.

**VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK**

[38] Eduplan:

Gebruiksramme is dikwels die mees vergete diere op 'n veeplaas.

Hulle moet fiks, gesond en in goeie kondisie wees as hulle by die ooie kom. Goeie ramme eet minder as hulle tussen die ooie is en verloor massa.

Daarom moet hulle in goeie kondisie wees (nie oorvet nie) as hulle by die ooie kom.

'n Gesonde ram in goeie kondisie se semenproduksie sal ook bogemiddeld wees.

[39] Eduplan:

1 Mikskeer die ooie as hulle lang wol het. Dit vergemaklik die dek-proses

[40] Eduplan:

1 Ensootiese aborsie in 'n kudde kan tot groot verliese van fetusse lei. 'n Mens moet vermoed dat die ooie ensootiese aborsie het wanneer heelwat minder lamms gebore word as wat in die ooie gescan is.

2 Die entstof is duur en soms skaars. Probeer dus om slegs die vervangings-ooie jaarliks te ent met lewendige entstof. Dit sal lewenslange immuniteit gee.

[41] Eduplan:

1 Vit A en minerale soos sink speel 'n belangrike rol by seldeling na bevrugting plaasgevind het. Dit is slegs nodig om Vit A in die winter en lente aan te vul.

[42] Eduplan:

1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[43] Eduplan:

1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[44] Eduplan:

In die verlede is koggelramme vir 14 dae by die ooie gelos. Nuwe navorsing het getoon dat dit beter is om vir 9 dae te koggel. Koggelramme veroorsaak dat die ooie binne 10 dae nadat die koggelramme bygesit is, begin ovuleer. Daarby, veroorsaak die koggelramme dat die ooie oor 'n korter periode ovuleer (dit is amper soos om die ooie se ovulasie te sinchroniseer). Hierdie ooie lam dan ook oor 'n korter periode. Dit help om die toesig oor die lamproses te konsentreer. Voorts is die ouderdomsverskil tussen die oudste en jongste lamms kleiner. Dit vergemaklik die seleksie van veral ooi- en ramlamms aansienlik.

1 Deur koggelramme by 'n herfsparing te gebruik sal nie noodwendig die besetting verbeter nie, maar wel die lamtyd verkort.

2 1% koggelramme behoort voldoende te wees.

- 3 Ronderib Afrikaners en Afrino's werk goed as koggelramme.
- 4 Laat maak koggelramme minstens 3 maande voor die dekyd. Die semen wat in koggelramme voorkom neem sowat 8 weke om uitgeput te raak. U wil nie u ooie van die koggelramme laat lam nie.
- 5 Ramme wat dekgeraad is se lieste is pers gekleur, die testikels is groot en het 'n ferm aanvoeling en die byballe is so groot soos okkerneute.

[45] Eduplan:

Ooie se toestand moet in 'n "groeifase" wees as die ramme bykom. Dit sal help dat hulle beter ovuleer (meer ovums oor 'n korter tydperk) om meer lammers oor 'n korter tydperk te gee. Dit sal die dekydperk verkort, asook die lamtydperk.

- 1 Daar is niks wat 'n ooie beter op hitte laat kom as goeie voeding nie. Vars veld werk soos 'n bom.
- 2 As dit droog is, sal vars veld alleen nie help nie.  
Gee die ooie 150g tot 200g sjokolade graan per ooi per dag vanaf 9 dae voor die ramme bygesit word tot 17 dae nadat die ramme ingesit is.

[46] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[47] Eduplan:

- 1 Haal koggelramme teen laat-middag uit. Dan is dit koel en sal die ramme al die eerste nag baie goed werk.
- 2 Paar vervangings-ooie apart van die volwasse ooie. 'n Projek in Hanover het gewys dat jong ooie wat saam met volwasse ooie gepaar word, swak besetting het.
- 3 Gebruik minstens 5% ramme op die vervangings-ooie.
- 4 As daar in groot kampe of kampe met 'n bergagtige terrein gepaar word, moet u sorg dra dat die ooie en ramme wel bymekaar uitkom. Maak die vee elke 3 tot 4 dae bymekaar sodat hulle by mekaar uitkom.

DIE OOIE MOENIE TYDENS HIERDIE PERIODE HANTEER WORD NIE. DIT SAL DIE OVULASIE STOP.



## MOET VERAL NIE DIE OOIE SKEER NIE

[48] Eduplan:

Na bevrugting neem dit ongeveer 6 weke vir die fetus om aan die baarmoeder vas te heg. Hantering in hierdie periode kan veroorsaak dat die fetus nie vasheg nie.

[49] Eduplan:

1 Bloutong entstof veroorsaak dat diere wat geent word 'n koors ontwikkel.

In die geval van ramme gee dit aanleiding tot tydelike onvrugbaarheid.

As u met die bloutong inenting begin wanneer die ramme in die herfs by die ooie uitkom, word hierdie probleem opgelos.

2 Gebruik 'n kombiansie entstof vir bloednier en pastuerella, soos bv.

Multivax P

[50] Eduplan:

1 Volwasse ooie: As 90% en meer van die ooie dragtig is, prul die wat droog is. Sommige boere paar hierdie ooie met baster ramme. As hulle goed beset raak van die baster ramme, is daar fout met die ras-egte ramme.

2 Vervangings-ooie: As 70% en meer dragtig is, prul die wat droog is. Honderde projekte dwarsdeur die RSA het gewys dat vervangings-ooie wat met die eerste paring oorslaan, minstens 30% minder lammers produseer as die ootjies wat met die eerste paring dragtig raak. Hou eerder meer vervangings-ooie terug om hiervoor voorsiening te maak.

As minder as 70% dragtig is, is die fout by die "jockey". Gee die ooie dan weer 'n kans.

[51] Eduplan:

1 Dit is beter om ooie met kortwol te laat lam. Die redes hiervoor is as volg:

a Lang wol word besoedel tydens die lamproses, deur grond en veral bloed en die vrugwater.

b Ooie met kortwol gaan soek skuiling in koue, nat weer, terwyl langwol ooie dit nie doen nie.

Kortwol ooie se lammers oorleef sulke toestande beter.

c Kortwol ooie hanteer hittestres tydens die lamproses beter

2 Kort na geboorte het 'n lam 'n baie sterk drang om te suip (suig). Hy sal aan alle silindries voorwerpe in die omgewing van die ooie se uier suig.

Hy sal veral aan stukke lox wat rondom die uier hang suig. Daarom is dit goed om alle wolklossies

rondom die uier af te skeer sodat die lam dit nie met die spene verwar nie.

Ooie wat 'n moeilike geboorte gehad het, het dikwels 'n drup agter uit die vulva. As die ooi nie gemikskkeer is nie, beland hierdie onsuiverhede rondom die uier, waar die lam dit inneem. Die gevolg is dat die lam infeksie opdoen en vrek.

[52] Eduplan:

Gebruik 'n kombinasie-entstof vir bloednier, pasteurella en blou-uier soos bv. Multivax P Plus of Ultra Choice 7.

Rooiderm is 'n siekte van beeste. Bloedderm kom by skape voor. Dit is presies dieselfde siekte, maar het twee verskillende name. By skape kom die siekte veral op sappige aangeplante weidings voor. Beide siektes word deur die A-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Coglavax is die aangewese entstof vir skape. As die ooie ge-ent is, kry die lammers immuniteit deur die bies van die ooie.

Rooiderm van skape word veroorsaak deur 'n verdraaiing van die derms.

Bloedpens is 'n siekte wat by skaaplammers jonger as 'n week voorkom. Dit word deur die B-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Die kombinasie-entstof wat bloednier, pasteurella en blou-uier doen, doen ook hierdie siekte.

[53] Eduplan:

- 1 Interne parasiete kan die hormonale verandering in 'n laat-dragtige ooi waarneem. Hulle reageer hierop deur meer eiers te begin afskei sodat die lam/mers wat gebore gaan word, met eiers besmet kan raak.
- 2 Ooie moet hulle lammers goed kan ruik. Daarom is dosering teen neuswurm belangrik.
- 3 Gebruik 'n inspuitbare, langwerkende middel, wat ook neuswurm en ekto-parasiete beheer.

[54] Eduplan:

Doseer Vit A slegs in winter en lente

[55] Eduplan:

- 1 Maer ooie (kondisie onder 3) se lammers is baie klein by geboorte (veral tweeling lammers). Hierdie klein lammers se oorlewing is baie laag. Hulle is te swak om te suip, het nie energie om agter die ooie aan te loop nie, en is so lig en swak dat selfs klein roofdiere soos witkwas- en grys-muishonde hulle kan vang. Verliese van hierdie swak lammers is geweldig hoog.

OOIE WAT MAER IS AS HULLE LAM  
SE HER-BESETTING% IS OOK LAAG

Oorvet ooie kan probleme met groot lammers en lammers wat vassit ondervind; veral jong en eenling ooie. Dra dus sorg om hierdie ooie nie te swaar te laat word oor die laaste 6 weke van dragtigheid nie. Tweeling ooie het nooit probleme hiermee nie.

- 2 Die fetusse begin nou baie groot raak en neem 'n groot deel van die ooie se buikspasie op. Dit beperk die ooi se spasie om voer in te neem. Sy moet dus nou goeie kos ontvang wat nie te veel spasie in haar pens opneem nie. Proteien is veral belangrik.
- 3 Hierdie is die tyd wat die uier begin ontwikkel. Hoe beter dit nou ontwikkel, hoe meer bies en melk sal die ooi produseer.

[56] Eduplan:

- 1 Die fetusse begin nou baie groot raak en beperk die ooi se spasie om voer in te neem. Sy moet dus nou goeie kos ontvang wat nie te veel spasie in haar pens opneem nie. Daarom, is dit goed om om haar nou na spaarveld of lande te skuif.

2 NB As u op lande lam, moenie die eenling ooie voor hulle lam na die lande skuif nie. Dit kan veroorsaak dat die fetusse te groot word, met gevolglike lamprobleme (veral by vervangings-ooie).

[57] Edulan:

Dit is goedkoper om eerder die lammers as die ooie kos te gee. Hulle begin reeds op twee weke ouderdom vreet. Sodra hulle die kruipvoeding goed vreet, kan die ooie se lek verminder word (of selfs gestop word).

Lammers wat kruipvoeding kry kan op 'n heelwat jonger ouderdom gespeen word (indien nodig - soos wanneer dit droog is).

Hoe swaarder die lammers by speen, hoe beter die naspeense groei.

[58] Eduplan:

SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers verloor.

Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.

[59] Louis:

Baie boere kry dat hul lammers goed groei tot hulle 2 maande oud is. Daarna gaan staan hul groei stil.

Ooie se melkproduksie neem 42 dae nadat sy gelam het vinnig af. Dan moet die lam goed vreet of sy groei gaan staan stil. Sy ma en die ander ooie is dan sy grootste kompetisie vir kos. Daarom is dit nodig om tydens hierdie periode na nuwe kampe te skuif.

[60] Eduplan:

1 Gewoonlik kry lammeers eerste mellintwurm. Hulle kry eers op sowat 3 maande ouderdom lintwurm.

2 Doseer lammers met 'n goedkoop orale middel vir melklintwurm

[61] Eduplan:

Gebruik 'n kombinasie-entsof soos bv. Multivax P. Ent alle lammers, ook die wat binnekort verkoop gaan word. Die weerstand wat vanaf die ooie se bies ontvang is, is nou baie laag.

[62] Eduplan:

Gebruik 'n baie goeie, kombinasie orale dossermiddel soos bv. First Drench

[63] Eduplan:

- 1 SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers tussen merk en speen verloor. Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.
- 2 Moenie die boepens lammers speen nie. Los hulle by die ooie vir 'n verdere 14 dae sodat die ooie, wie se boepens lammers dit is, met SOOG & DROOG uitgeken kan word.
- 3 Seleksieplan vr die vervangings-ooie verskyn op die volgende bladsy (klik op SELEKSIEPLAN hieronder).
- 4 Ou ooie lam goed maar maak nie lammers groot nie. Bek al die ooie en gooi die uit wat sluit. As hulle nie geslag word nie, gee hulle dadelik weer ram en verkoop dragtig gesertifiseer.

[64] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

[65] Eduplan:

SOOG & DROOG die ooie om te bepaal watter ooie die moeders is van die boepens lammers. Hulle is swak moeders en moet geprul word. Merk hulle en verkoop hulle saam met hul lammers.

[66] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

[67] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word. Hierna word die vervangings-ooie saam met die teel-ooie ge-ent en gedoseer.

[68] Eduplan:

Januarie = JAN  
Februarie = FEB  
Maart = MAR  
April = APR  
Mei = MAY  
Junie = JUN  
Julie = JUL  
Augustus = AUG  
September = SEP  
Oktober = OCT  
November = NOV  
Desember = DEC

[69] Eduplan:

- 1 Ramme kan van die een dekseisoen na die ander onvrugbaar word. Toets die ramme elke keer voordat hulle na die ooie gaan vir vrugbaarheid en veneriese siektes. Nuwe ramme kan veneriese siektes inbring.
- 2 Ramme kan tydelik onvrugbaar word as hulle byvoorbeeld geskeer of vervoer word. Daarna neem dit minstens 8 weke om weer hul semen-volume aan te vul. Ramme moet dus klaar geskeer wees minstens 8 weke voor paartyd.
- 3 Koop nuwe ramme ook minstens 8 weke voor paartyd aan. Toets alle nuwe ramme vir veneriese siektes. Hou hulle apart van die ander ramme op die plaas totdat die toets-uitslae bekend is. Ramme kan mekaar aansteek.
- 4 Ons vergeet te maklik van die ramme op die plaas. Knap hul bestuur op.
- 5 Fikse ramme dek beter as oorvet, onfikse ramme. Stap rustig met die ramme vir 1 km per dag.
- 6 Ramme met 'n goeie libido en wat dekbehendig is gee aanleiding tot aansienlik meer lammers en oor 'n korter tydperk. 'n Projek in Noupoot het getoon dat dekbehendige ramme met 'n goeie libido tot soveel as 20% meer lammers gee as ramme wat lui is en nie goed kan dek nie. Probeer om 'n ram minstens een keer in sy leeftyd vir libido en

dekbeheerigheid te laat toets. Hoe jonget hoe beter. Moenie dink dat volwasse ramme beter doen as jong ramme nie. Daar is jong ramme wat nog nooit gedek het nie, wat baie dekbeheerig is met 'n goeie libido. Netso, is daar volwasse ramme wat nie kan dek nie en glad nie in ooie belangstel nie.

[70] Eduplan:

- 1 Maak ramme vroegtydig skoon van interne parasiete, verkieslik met 'n breespektrum inspuitbare middel, sodat hulle gesond en fiks is as hulle na die ooie gaan.
- 2 Die dosering wat toegedien word, moet ook neuswurm behandel. Ramme moet die ooie wat op hitte is goed kan ruik.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[71] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale, veral sink, speel 'n belangrike rol by seldeling, wat belangrik is vir goeie semenproduksie. Slegs nodig om in die winter en lente aan te vul.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[72] Eduplan:

Gebruiksramme is dikwels die mees vergete diere op 'n veeplaas.

Hulle moet fiks, gesond en in goeie kondisie wees as hulle by die ooie kom. Goeie ramme eet minder as hulle tussen die ooie is en verloor massa. Daarom moet hulle in goeie kondisie wees (nie oorvet nie) as hulle by die ooie kom.

'n Gesonde ram in goeie kondisie se semenproduksie sal ook bogemiddeld wees.

[73] Eduplan:

- 1 Mikskeer die ooie as hulle lang wol het. Dit vergemaklik die dek-proses

[74] Eduplan:

- 1 Ensootiese aborsie in 'n kudde kan tot groot verliese van fetusse lei. 'n Mens moet vermoed dat die ooie ensootiese aborsie het wanneer heelwat minder lammers gebore word as wat in die ooie gescan is.
- 2 Die entstof is duur en soms skaars. Probeer dus om slegs die vervangings-ooie jaarliks te ent met lewendige entstof. Dit sal lewenslange immuniteit gee.

[75] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale soos sink speel 'n belangrike rol by seldeling na bevrugting plaasgevind het. Dit is slegs nodig om Vit A in die winter en lente aan te vul.

[76] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[77] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[78] Eduplan:

- 1 Ramme wat dekgeraad is se lieste is pers gekleur, die testikels is groot en het 'n ferm aanvoeling en die byballe is so groot soos okkerneute.

[79] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[80] Eduplan:

- 1 Paar vervangings-ooie apart van die volwasse ooie. 'n Projek in Hanover het gewys dat jong ooie wat saam met volwasse ooie gepaar word, swak besetting het.
- 2 Gebruik minstens 5% ramme op die vervangings-ooie.
- 3 As daar in groot kampe of kampe met 'n bergagtige terrein gepaar word, moet u sorg dra dat die ooie en ramme wel bymekaar uitkom. Maak die vee elke 3 tot 4 dae bymekaar sodat hulle by mekaar uitkom.

DIE OOIE MOENIE TYDENS HIERDIE PERIODE HANTEER WORD NIE. DIT SAL DIE OVULASIE STOP.  
MOET VERAL NIE DIE OOIE SKEER NIE

[81] Eduplan:

Na bevrugting neem dit ongeveer 6 weke vir die fetus om aan die baarmoeder vas te heg. Hantering in hierdie periode kan veroorsaak dat die fetus nie vasheg nie.



[82] Eduplan:

- 1 Bloutong entstof veroorsaak dat diere wat geent word 'n koors ontwikkel. In die geval van ramme gee dit aanleiding tot tydelike onvrugbaarheid. As u met die bloutong inenting begin wanneer die ramme in die herfs by die ooie uitkom, word hierdie probleem oppgelos.
- 2 Gebruik 'n kombiansie entstof vir bloednier en pastuerella, soos bv. Multivax P

[83] Eduplan:

- 1 Volwasse ooie: As 90% en meer van die ooie dragtig is, prul die wat droog is. Sommige boere paar hierdie ooie met baster ramme. As hulle goed beset raak van die baster ramme, is daar fout met die ras-egte ramme.
- 2 Vervangings-ooie: As 70% en meer dragtig is, prul die wat droog is. Honderde projekte dwarsdeur die RSA het gewys dat vervangings-ooie wat met die eerste paring oorslaan, minstens 30% minder lammers produseer as die ootjies wat met die eerste paring dragtig raak. Hou eerder meer vervangings-ooie terug om hiervoor voorsiening te maak.

As minder as 70% dragtig is, is die fout by die "jockey". Gee die ooie dan weer 'n kans.

[84] Eduplan:

- 1 Dit is beter om ooie met kortwol te laat lam. Die redes hiervoor is as volg:
  - a Lang wol word besoedel tydens die lamproses, deur grond en veral bloed en die vrugwater.
  - b Ooie met kortwol gaan soek skuiling in koue, nat weer, terwyl langwol ooie dit nie doen nie. Kortwol ooie se lammers oorleef sulke toestande beter.
  - c Kortwol ooie hanteer hittestres tydens die lamproses beter
- 2 Kort na geboorte het 'n lam 'n baie sterk drang om te suip (suig). Hy sal aan alle silindries voorwerpe in die omgewing van die ooie se uier suig. Hy sal veral aan stukke lox wat rondom die uier hang suig. Daarom is dit goed om alle wolklossies rondom die uier af te skeer sodat die lam dit nie met die spene verwar nie.

Ooie wat 'n moeilike geboorte gehad het, het dikwels 'n drup agter uit die vulva. As die ooi nie gemikskeer is nie, beland hierdie onsuiverhede rondom die uier, waar die lam dit inneem. Die gevolg is dat die lam infeksie opdoen en vrek.

[85] Eduplan:

Gebruik 'n kombinasie-entstof vir bloednier, pasteurella en blou-uier soos bv. Multivax P Plus of Ultra Choice 7.

Rooiderm is 'n siekte van beeste. Bloedderm kom by skape voor. Dit is presies dieselfde siekte, maar het twee verskillende name. By skape kom die siekte veral op sappige aangeplante weidings voor. Beide siektes word deur die A-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Coglavax is die aangewese entstof vir skape. As die ooie ge-ent is, kry die lammers immuniteit deur die bies van die ooie.

Rooiderm van skape word veroorsaak deur 'n verdraaiing van die derms.

Bloedpens is 'n siekte wat by skaaplammers jonger as 'n week voorkom. Dit word deur die B-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Die kombinasie-entstof wat bloednier, pasteurella en blou-uier doen, doen ook hierdie siekte.

[86] Eduplan:

- 1 Interne parasiete kan die hormonale verandering in 'n laat-dragtige ooi waarneem. Hulle reageer hierop deur meer eiers te begin afskei sodat die lam/mers wat gebore gaan word, met eiers besmet kan raak.
- 2 Ooie moet hulle lammers goed kan ruik. Daarom is dosering teen neuswurm belangrik.
- 3 Gebruik 'n inspuitbare, langwerkende middel, wat ook neuswurm en ekto-parasiete beheer.

[87] Eduplan:

Doseer Vit A slegs in winter en lente

[88] Eduplan:

- 1 Maer ooie (kondisie onder 3) se lammers is baie klein by geboorte (veral tweeling lammers). Hierdie klein lammers se oorlewing is baie laag. Hulle is te swak om te suip, het nie energie om agter die ooie aan te loop nie, en is so lig en swak dat selfs klein roofdiere soos witkwas- en

grys-muishonde hulle kan vang. Verliese van hierdie swak lammers is geweldig hoog.

OOIE WAT MAER IS AS HULLE LAM SE HER-BESETTING% IS OOK LAAG

Oorvet ooie kan problemere met groot lammers en lammers wat vassit ondervind; veral jong en eenling ooie. Dra dus sorg om hierdie ooie nie te swaar te laat word oor die laaste 6 weke van dragtigheid nie. Tweeling ooie het nooit probleme hiermee nie.

- 2 Die fetusse begin nou baie groot raak en neem 'n groot deel van die ooie se buikspasie op. Dit beperk die ooi se spasie om voer in te neem. Sy moet dus nou goeie kos ontvang wat nie te veel spasie in haar pens opneem nie. Proteien is veral belangrik.
- 3 Hierdie is die tyd wat die uier begin ontwikkel. Hoe beter dit nou ontwikkel, hoe meer bies en melk sal die ooi produseer.

[89] Edulan:

Dit is goedkoper om eerder die lammers as die ooie kos te gee. Hulle begin reeds op twee weke ouderdom vreet. Sodra hulle die kruipvoeding goed vreet, kan die ooie se lek verminder word (of selfs gestop word).

Lammers wat kruipvoeding kry kan op 'n heelwat jonger ouderdom gespeen word (indien nodig - soos wanneer dit droog is).

Hoe swaarder die lammers by speen, hoe beter die naspeense groei.

[90] Eduplan:

SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers verloor.

Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.

[91] Eduplan:

- 1 Gewoonlik kry lammeers eerste mellintwurm. Hulle kry eers op sowat 3 maande ouderdom lintwurm.
- 2 Doseer lammers met 'n goedkoop orale middel vir melklintwurm

[92] Eduplan:

- 1 SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers tussen merk en speen verloor. Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.
- 2 Moenie die boepens lammers speen nie. Los hulle by die ooie vir 'n verdere 14 dae sodat die ooie, wie se boepens lammers dit is, met SOOG & DROOG uitgeken kan word.
- 3 Seleksieplan vir die vervangings-ooie verskyn op die volgende bladsy (klik op SELEKSIEPLAN hieronder).
- 4 Ou ooie lam goed maar maak nie lammers groot nie. Bek al die ooie en gooi die uit wat sluit. As hulle nie geslag word nie, gee hulle dadelik weer ram en verkoop dragtig gesertifiseer.

[93] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

Gebruik 'n kombinasie-entsof soos bv. Multivax P. Ent alle lammers, ook die wat binnekort verkoop gaan word. Die weerstand wat vanaf die ooie se bies ontvang is, is nou baie laag.

[94] Eduplan:

Gebruik 'n baie goeie, kombinasie orale dossermiddel soos bv. First Drench

[95] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

[96] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word. Hierna word die vervangings-ooie saam met die teel-ooie ge-ent en gedoseer.

[97] Eduplan:

- 1 Ramme kan van die een dekseisoen na die ander onvrugbaar word. Toets die ramme elke keer voordat hulle na die ooie gaan vir vrugbaarheid en veneriese siektes. Nuwe ramme kan veneriese siektes inbring.
- 2 Ramme kan tydelik onvrugbaar word as hulle byvoorbeeld geskeer of vervoer word. Daarna neem dit minstens 8 weke om weer hul semen-volume aan te vul. Ramme moet dus klaar geskeer wees minstens 8 weke voor paartyd.
- 3 Koop nuwe ramme ook minstens 8 weke voor paartyd aan. Toets alle nuwe ramme vir veneriese siektes. Hou hulle apart van die ander ramme op die plaas totdat die toets-uitslae bekend is. Ramme kan mekaar aansteek.
- 4 Ons vergeet te maklik van die ramme op die plaas. Knap hul bestuur op.
- 5 Fikse ramme dek beter as oorvet, onfikse ramme. Stap rustig met die ramme vir 1 km per dag.
- 6 Ramme met 'n goeie libido en wat dekbeendig is gee aanleiding tot aansienlik meer lammers en oor 'n korter tydperk. 'n Projek in Noupoot het getoon dat dekbeendige ramme met 'n goeie libido tot soveel as 20% meer lammers gee as ramme wat lui is en nie goed kan dek nie. Probeer om 'n ram minstens een keer in sy leeftyd vir libido en dekbeendigheid te laat toets. Hoe jonget hoe beter. Moenie dink dat volwasse ramme beter doen as jong ramme nie. Daar is jong ramme wat nog nooit gedek het nie, wat baie dekbeendig is met 'n goeie libido. Netso, is daar volwasse ramme wat nie kan dek nie en glad nie in ooie belangstel nie.

[98] Eduplan:

- 1 Maak ramme vroegtydig skoon van interne parasiete, verkieslik met 'n breespektrum inspuibare middel, sodat hulle gesond en fiks is as hulle na die ooie gaan.
- 2 Die dosering wat toegedien word, moet ook neuswurm behandel. Ramme moet die ooie wat op hitte is goed kan ruik.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE

OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[99] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale, veral sink, speel 'n belangrike rol by seldeling, wat belangrik is vir goeie semenproduksie. Slegs nodig om in die winter en lente aan te vul.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE  
OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[100] Eduplan:

Gebruiksramme is dikwels die mees vergete diere op 'n veeplaas.

Hulle moet fiks, gesond en in goeie kondisie wees as hulle by die ooie kom. Goeie ramme eet minder as hulle tussen die ooie is en verloor massa. Daarom moet hulle in goeie kondisie wees (nie oorvet nie) as hulle by die ooie kom.

'n Gesonde ram in goeie kondisie se semenproduksie sal ook bogemiddeld wees.

[101] Eduplan:

- 1 Ensootiese aborsie in 'n kudde kan tot groot verliese van fetusse lei. 'n Mens moet vermoed dat die ooie ensootiese aborsie het wanneer heelwat minder lammers gebore word as wat in die ooie gescan is.
- 2 Die entstof is duur en soms skaars. Probeer dus om slegs die vervangings-ooie jaarliks te ent met lewendige entstof. Dit sal lewenslange immuniteit gee.

[102] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale soos sink speel 'n belangrike rol by seldeling na bevrugting plaasgevind het. Dit is slegs nodig om Vit A in die winter en lente aan te vul.

[103] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[104] Eduplan:

- 1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[105] Eduplan:

1 Ramme wat dekgeraad is se lieste is pers gekleur, die testikels is groot en het 'n ferm aanvoeling en die byballe is so groot soos okkerneute.

[106] Eduplan:

1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[107] Eduplan:

1 Paar vervangings-ooie apart van die volwasse ooie. 'n Projek in Hanover het gewys dat jong ooie wat saam met volwasse ooie gepaar word, swak besetting het.

2 Gebruik minstens 5% ramme op die vervangings-ooie.

3 As daar in groot kampe of kampe met 'n bergagtige terrein gepaar word, moet u sorg dra dat die ooie en ramme wel bymekaar uitkom. Maak die vee elke 3 tot 4 dae bymekaar sodat hulle by mekaar uitkom.

DIE OOIE MOENIE TYDENS HIERDIE PERIODE HANTEER WORD NIE. DIT SAL DIE OVULASIE STOP.  
MOET VERAL NIE DIE OOIE SKEER NIE

[108] Eduplan:

Na bevrugting neem dit ongeveer 6 weke vir die fetus om aan die baarmoeder vas te heg. Hantering in hierdie periode kan veroorsaak dat die fetus nie vasheg nie.

[109] Eduplan:

1 Volwasse ooie: As 90% en meer van die ooie dragtig is, prul die wat droog is. Sommige boere paar hierdie ooie met baster ramme. As hulle goed beset raak van die baster ramme, is daar fout met die ras-egte ramme.

2 Vervangings-ooie: As 70% en meer dragtig is, prul die wat droog is. Honderde projekte dwarsdeur die RSA het gewys dat vervangings-ooie wat met die eerste paring oorslaan, minstens 30% minder lammers produseer as die ootjies wat met die eerste paring dragtig raak. Hou eerder meer vervangings-ooie terug om hiervoor voorsiening te maak.

As minder as 70% dragtig is, is die fout by die "jockey". Gee die ooie dan weer 'n kans.

[110] Eduplan:

1 Dit is beter om ooie met kortwol te laat lam. Die redes hiervoor is as volg:

- a Lang wol word besoedel tydens die lamproses, deur grond en veral bloed en die vrugwater.
  - b Ooie met kortwol gaan soek skuiling in koue, nat weer, terwyl langwol ooie dit nie doen nie.  
Kortwol ooie se lammers oorleef sulke toestande beter.
  - c Kortwol ooie hanteer hittestres tydens die lamproses beter
- 2 Kort na geboorte het 'n lam 'n baie sterk drang om te suip (suig). Hy sal aan alle silindries voorwerpe in die omgewing van die ooie se uier suig.  
Hy sal veral aan stukke lox wat rondom die uier hang suig. Daarom is dit goed om alle wolklossies rondom die uier af te skeer sodat die lam dit nie met die spene verwar nie.

Ooie wat 'n moeilike geboorte gehad het, het dikwels 'n drup agter uit die vulva. As die ooi nie gemikskere is nie, beland hierdie onsuiverhede rondom die uier, waar die lam dit inneem. Die gevolg is dat die lam infeksie opdoen en vrek.

[111] Eduplan:

Gebruik 'n kombinasie-entstof vir bloednier, pasteurella en blou-uier soos  
bv. Multivax P Plus of Ultra Choice 7.

Rooiderm is 'n siekte van beeste. Bloedderm kom by skape voor. Dit is presies dieselfde siekte, maar het twee verskillende name. By skape kom die siekte veral op sappige aangeplante weidings voor. Beide siektes word deur die A-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Coglavax is die aangewese entstof vir skape. As die ooie ge-ent is, kry die lammers immuniteit deur die bies van die ooie.

Rooiderm van skape word veroorsaak deur 'n verdraaiing van die derms.

Bloedpens is 'n siekte wat by skaaplammers jonger as 'n week voorkom. Dit word deur die B-serotipe van *C. perfringens* veroorsaak. Die kombinasie-entstof wat bloednier, pasteurella en blou-uier doen, doen ook hierdie siekte.

[112] Eduplan:

- 1 Interne parasiete kan die hormonale verandering in 'n laat-dragtige ooi waarneem. Hulle reageer hierop deur meer eiers te begin afskei sodat die lam/mers wat gebore gaan word, met eiers besmet kan raak.
- 2 Ooie moet hulle lammers goed kan ruik. Daarom is dosering teen neuswurm belangrik.



3 Gebruik 'n inspuibare, langwerkende middel, wat ook neuswurm en ekto-parasiete beheer.

[113] Eduplan:

Doseer Vit A slegs in winter en lente

[114] Eduplan:

1 Maer ooie (kondisie onder 3) se lammers is baie klein by geboorte (veral tweeling lammers). Hierdie klein lammers se oorlewing is baie laag. Hulle is te swak om te suip, het nie energie om agter die ooie aan te loop nie, en is so lig en swak dat selfs klein roofdiere soos witkwas- en grys-muishonde hulle kan vang. Verliese van hierdie swak lammers is geweldig hoog.

OOIE WAT MAER IS AS HULLE LAM  
SE HER-BESETTING% IS OOK LAAG

Oorvet ooie kan probleme met groot lammers en lammers wat vassit ondervind; veral jong en eenling ooie. Dra dus sorg om hierdie ooie nie te swaar te laat word oor die laaste 6 weke van dragtigheid nie. Tweeling ooie het nooit probleme hiermee nie.

2 Die fetusse begin nou baie groot raak en neem 'n groot deel van die ooie se buikspasie op. Dit beperk die ooi se spasie om voer in te neem. Sy moet dus nou goeie kos ontvang wat nie te veel spasie in haar pens opneem nie. Proteien is veral belangrik.

3 Hierdie is die tyd wat die uier begin ontwikkel. Hoe beter dit nou ontwikkel, hoe meer bies en melk sal die ooi produseer.

[115] Edulan:

Dit is goedkoper om eerder die lammers as die ooie kos te gee. Hulle begin reeds op twee weke ouderdom vreet. Sodra hulle die kruipvoeding goed vreet, kan die ooie se lek verminder word (of selfs gestop word).

Lammers wat kruipvoeding kry kan op 'n heelwat jonger ouderdom gespeen word (indien nodig - soos wanneer dit droog is).

Hoe swaarder die lammers by speen, hoe beter die naspeense groei.

[116] Eduplan:

SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers verloor.

Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.

[117] Eduplan:

- 1 Gewoonlik kry lammeers eerste mellintwurm. Hulle kry eers op sowat 3 maande ouderdom lintwurm.
- 2 Doseer lammers met 'n goedkoop orale middel vir melklintwurm

[118] Eduplan:

- 1 SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers tussen merk en speen verloor. Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.
- 2 Moenie die boepens lammers speen nie. Los hulle by die ooie vir 'n verdere 14 dae sodat die ooie, wie se boepens lammers dit is, met SOOG & DROOG uitgeken kan word.
- 3 Seleksieplan vir die vervangings-ooie verskyn op die volgende bladsy (klik op SELEKSIEPLAN hieronder).
- 4 Ou ooie lam goed maar maak nie lammers groot nie. Bek al die ooie en gooi die uit wat

sluit. As hulle nie geslag word nie, gee hulle dadelik weer ram en verkoop dragtig gesertifiseer.

[119] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

Gebruik 'n kombinasie-entsof soos bv. Multivax P. Ent alle lammers, ook die wat binnekort verkoop gaan word. Die weerstand wat vanaf die ooie se bies ontvang is, is nou baie laag.

[120] Eduplan:

Gebruik 'n baie goeie, kombinasie orale dossermiddel soos bv. First Drench

[121] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

[122] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word. Hierna word die vervangings-ooie saam met die teel-ooie ge-ent en gedoseer.

[123] Eduplan:

- 1 Ramme kan van die een dekseisoen na die ander onvrugbaar word. Toets die ramme elke keer voordat hulle na die ooie gaan vir vrugbaarheid en veneriese siektes. Nuwe ramme kan veneriese siektes inbring.
- 2 Ramme kan tydelik onvrugbaar word as hulle byvoorbeeld geskeer of vervoer word. Daarna neem dit minstens 8 weke om weer hul semen-volume aan te vul. Ramme moet dus klaar geskeer wees minstens 8 weke voor paartyd.
- 3 Koop nuwe ramme ook minstens 8 weke voor paartyd aan. Toets alle nuwe ramme vir veneriese siektes. Hou hulle apart van die ander ramme op die plaas totdat die toets-uitslae bekend is. Ramme kan mekaar aansteek.
- 4 Ons vergeet te maklik van die ramme op die plaas. Knap hul bestuur op.
- 5 Fikse ramme dek beter as oorvet, onfikse ramme. Stap rustig met die ramme vir 1 km per dag.
- 6 Ramme met 'n goeie libido en wat dekbeendig is gee aanleiding tot aansienlik meer lammers en oor 'n korter tydperk. 'n

Projek in Noupoot het getoon dat dekbeholdige ramme met 'n goeie libido tot soveel as 20% meer lammers gee as ramme wat lui is en nie goed kan dek nie. Probeer om 'n ram minstens een keer in sy leeftyd vir libido en dekbeholdigheid te laat toets. Hoe jonget hoe beter. Moenie dink dat volwasse ramme beter doen as jong ramme nie. Daar is jong ramme wat nog nooit gedek het nie, wat baie dekbeholdig is met 'n goeie libido. Netso, is daar volwasse ramme wat nie kan dek nie en glad nie in ooie belangstel nie.

[124] Eduplan:

- 1 Maak ramme vroegtydig skoon van interne parasiete, verkieslik met 'n breespektrum inspuibare middel, sodat hulle gesond en fiks is as hulle na die ooie gaan.
- 2 Die dosering wat toegedien word, moet ook neuswurm behandel. Ramme moet die ooie wat op hitte is goed kan ruik.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[125] Eduplan:

- 1 Vit A en minerale, veral sink, speel 'n belangrike rol by seldeling, wat belangrik is vir goeie semenproduksie. Slegs nodig om in die winter en lente aan te vul.

VOLTOOI HIERDIE AKSIES MINSTENS 8 WEKE VOORDAT DIE RAMME BY DIE OOIE KOM. DIE HANTERING KAN HULLE TYDELIK ONVRUGBAAR MAAK

[126] Eduplan:

Gebruiksramme is dikwels die mees vergete diere op 'n veeplaas.

Hulle moet fiks, gesond en in goeie kondisie wees as hulle by die ooie kom. Goeie ramme eet minder as hulle tussen die ooie is en verloor massa. Daarom moet hulle in goeie kondisie wees (nie oorvet nie) as hulle by die ooie kom.

'n Gesonde ram in goeie kondisie se semenproduksie sal ook bogemiddeld wees.

[127] Eduplan:

- 1 Mikskeer die ooie as hulle lang wol het. Dit vergemaklik die dek-proses

[128] Eduplan:

- 1 Ensootiese aborsie in 'n kudde kan tot groot verliese van fetusse lei. 'n Mens moet vermoed dat die ooie ensootiese aborsie het wanneer heelwat minder lammers gebore word as wat in die ooie gescan is.

2 Die entstof is duur en soms skaars. Probeer dus om slegs die vervangings-ooie jaarliks te ent met lewendige entstof. Dit sal lewenslange immuniteit gee.

[129] Eduplan:

1 Vit A en minerale soos sink speel 'n belangrike rol by seldeling na bevrugting plaasgevind het. Dit is slegs nodig om Vit A in die winter en lente aan te vul.

[130] Eduplan:

1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[131] Eduplan:

1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[132] Eduplan:

1 Ramme wat dekgeraad is se lieste is pers gekleur, die testikels is groot en het 'n ferm aanvoeling en die byballe is so groot soos okkerneute.

[133] Eduplan:

1 Koringkiem stimuleer semen produksie. Doseer elke ram met 10ml een keer per week.

[134] Eduplan:

1 Paar vervangings-ooie apart van die volwasse ooie. 'n Projek in Hanover het gewys dat jong ooie wat saam met volwasse ooie gepaar word, swak besetting het.

2 Gebruik minstens 5% ramme op die vervangings-ooie.

3 As daar in groot kampe of kampe met 'n bergagtige terrein gepaar word, moet u sorg dra dat die ooie en ramme wel bymekaar uitkom. Maak die vee elke 3 tot 4 dae bymekaar sodat hulle by mekaar uitkom.

DIE OOIE MOENIE TYDENS HIERDIE PERIODE HANTEER WORD NIE. DIT SAL DIE OVULASIE STOP.  
MOET VERAL NIE DIE OOIE SKEER NIE

[135] Eduplan:

Na bevrugting neem dit ongeveer 6 weke vir die fetus om aan die baarmoeder vas te heg. Hantering in hierdie periode kan veroorsaak dat die fetus nie vasheg nie.

[136] Eduplan:

- 1 Bloutong entstof veroorsaak dat diere wat geent word 'n koors ontwikkel. In die geval van ramme gee dit aanleiding tot tydelike onvrugbaarheid. As u met die bloutong inenting begin wanneer die ramme in die herfs by die ooie uitkom, word hierdie probleem opgelos.
- 2 Gebruik 'n kombiansie entstof vir bloednier en pastuerella, soos bv. Multivax P

[137] Eduplan:

- 1 Volwasse ooie: As 90% en meer van die ooie dragtig is, prul die wat droog is. Sommige boere paar hierdie ooie met baster ramme. As hulle goed beset raak van die baster ramme, is daar fout met die ras-egte ramme.
- 2 Vervangings-ooie: As 70% en meer dragtig is, prul die wat droog is. Honderde projekte dwarsdeur die RSA het gewys dat vervangings-ooie wat met die eerste paring oorslaan, minstens 30% minder lammers produseer as die ootjies wat met die eerste paring dragtig raak. Hou eerder meer vervangings-ooie terug om hiervoor voorsiening te maak.

As minder as 70% dragtig is, is die fout by die "jockey". Gee die ooie dan weer 'n kans.

[138] Eduplan:

- 1 Dit is beter om ooie met kortwol te laat lam. Die redes hiervoor is as volg:
  - a Lang wol word besoedel tydens die lamproses, deur grond en veral bloed en die vrugwater.
  - b Ooie met kortwol gaan soek skuiling in koue, nat weer, terwyl langwol ooie dit nie doen nie. Kortwol ooie se lammers oorleef sulke toestande beter.
  - c Kortwol ooie hanteer hittestres tydens die lamproses beter
- 2 Kort na geboorte het 'n lam 'n baie sterk drang om te suip (suig). Hy sal aan alle silindries voorwerpe in die omgewing van die ooie se uier suig. Hy sal veral aan stukke lox wat rondom die uier hang suig. Daarom is dit goed om alle wolklossies rondom die uier af te skeer sodat die lam dit nie met die spene verwar nie.

Ooie wat 'n moeilike geboorte gehad het, het dikwels 'n drup agter uit die vulva. As die ooi nie gemikskeer is nie, beland hierdie onsuiverhede rondom die uier, waar die lam dit inneem. Die gevolg is

dat die lam infeksie opdoen en vrek.

[139] Eduplan:

Gebruik 'n kombinasie-entstof vir bloednier, pasteurella en blou-uier soos bv. Multivax P Plus of Ultra Choice 7.

Rooiderm is 'n siekte van beeste. Bloedderm kom by skape voor. Dit is presies dieselfde siekte, maar het twee verskillende name. By skape kom die siekte veral op sappige aangeplante weidings voor. Beide siektes word deur die A-serotipe van C. perfringens veroorsaak. Coglavax is die aangewese entstof vir skape. As die ooie ge-ent is, kry die lammers immuniteit deur die bies van die ooie.

Rooiderm van skape word veroorsaak deur 'n verdraaiing van die derms.

Bloedpens is 'n siekte wat by skaaplammers jonger as 'n week voorkom. Dit word deur die B-serotipe van C. perfringens veroorsaak. Die kombinasie-entstof wat bloednier, pasteurella en blou-uier doen, doen ook hierdie siekte.

[140] Eduplan:

- 1 Interne parasiete kan die hormonale verandering in 'n laat-dragtige ooi waarneem. Hulle reageer hierop deur meer eiers te begin afskei sodat die lam/mers wat gebore gaan word, met eiers besmet kan raak.
- 2 Ooie moet hulle lammers goed kan ruik. Daarom is dosering teen neuswurm belangrik.
- 3 Gebruik 'n inspuitbare, langwerkende middel, wat ook neuswurm en ekto-parasiete beheer.

[141] Eduplan:

Doseer Vit A slegs in winter en lente

[142] Eduplan:

- 1 Maer ooie (kondisie onder 3) se lammers is baie klein by geboorte (veral tweeling lammers). Hierdie klein lammers se oorlewing is baie laag.

Hulle is te swak om te suip, het nie energie om agter die ooie aan te loop nie, en is so lig en swak dat selfs klein roofdiere soos witkwas- en grys-muishonde hulle kan vang. Verliese van hierdie swak lammers is geweldig hoog.

OOIE WAT MAER IS AS HULLE LAM  
SE HER-BESETTING% IS OOK LAAG

Oorvet ooie kan problemere met groot lammers en lammers wat vassit ondervind; veral jong en eenling ooie. Dra dus sorg om hierdie ooie nie te swaar te laat word oor die laaste 6 weke van dragtigheid nie. Tweeling ooie het nooit probleme hiermee nie.

- 2 Die fetusse begin nou baie groot raak en neem 'n groot deel van die ooie se buikspasie op. Dit beperk die ooi se spasie om voer in te neem. Sy moet dus nou goeie kos ontvang wat nie te veel spasie in haar pens opneem nie. Proteien is veral belangrik.
- 3 Hierdie is die tyd wat die uier begin ontwikkel. Hoe beter dit nou ontwikkel, hoe meer bies en melk sal die ooi produseer.

[143] Edulan:

Dit is goedkoper om eerder die lammers as die ooie kos te gee. Hulle begin reeds op twee weke ouderdom vreet. Sodra hulle die kruipvoeding goed vreet, kan die ooie se lek verminder word (of selfs gestop word).

Lammers wat kruipvoeding kry kan op 'n heelwat jonger ouderdom gespeen word (indien nodig - soos wanneer dit droog is).

Hoe swaarder die lammers by speen, hoe beter die naspeense groei.

[144] Eduplan:



SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers verloor.

Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.

[145] Eduplan:

- 1 Gewoonlik kry lammeers eerste melkintwurm. Hulle kry eers op sowat 3 maande ouderdom lintwurm.
- 2 Doseer lammers met 'n goedkoop orale middel vir melkintwurm

[146] Eduplan:

- 1 SOOG & DROOG = Keer die ooie om en inspekteer hul spene en uiers. Die ooie met pap uiers en vuil uiers, het nie 'n lam by hulle nie. Hulle het dus hul lammers tussen merk en speen verloor. Gee hierdie ooie 'n spesiale merk. Sodra hulle weer sonder 'n lam loop, moet hulle geprul word. Hulle is vrugbaar, maar maak nie lammers groot nie.
- 2 Moenie die boepens lammers speen nie. Los hulle by die ooie vir 'n verdere 14 dae sodat die ooie, wie se boepens lammers dit is, met SOOG & DROOG uitgeken kan word.
- 3 Seleksieplan vir die vervangings-ooie verskyn op die volgende bladsy (klik op SELEKSIEPLAN hieronder).
- 4 Ou ooie lam goed maar maak nie lammers groot nie. Bek al die ooie en gooi die uit wat sluit. As hulle nie geslag word nie, gee hulle dadelik weer ram en verkoop dragtig gesertifiseer.

[147] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

Gebruik 'n kombinasie-entsof soos bv. Multivax P. Ent alle lammers, ook die wat binnekort verkoop gaan word. Die weerstand wat vanaf die ooie se bies ontvang is, is nou baie laag.

[148] Eduplan:

Gebruik 'n baie goeie, kombinasie orale dossermiddel soos bv. First Drench

[149] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word

[150] Eduplan:

Ent slegs vervangings-ooilammers en lammers wat eers na die somer verkoop gaan word. Hierna word die vervangings-ooie saam met die teel-ooie ge-ent en gedoseer.